

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ ВТОРИЧНОЙ ГЛАУКОМЫ

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ	ВТОРИЧНАЯ ГЛАУКОМА (ВСЛЕДСТВИЕ ГЛАЗНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ)	СТЕРОИДНАЯ ГЛАУКОМА
ВОЗРАСТ	В любом возрасте (обычно сочетается с передним увеитом или следует за ним).	У лиц, чувствительных к стероидам, в любом возрасте после их продолжительного местного или системного применения для лечения глаз.
УГОЛ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ	Угол может блокироваться продуктами воспаления или пигментом.	Широко открыт или сужен (но не закрыт).
РОГОВИЦА	Бывает тусклой; возможен микрокистозный отек.	Обычно прозрачная.
ЗРАЧОК И РАДУЖКА	Зрачок может быть сужен; радужка иногда мутная.	Зрачок нормально реагирует на свет, не расширен и не сужен.
ДИСК ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА И ПОЛЕ ЗРЕНИЯ	Первоначально кажется нормальным; если состояние сохраняется, возможна его экскавация.	Первоначально никакой экскавации; без лечения может развиваться экскавация. Развиваются типичные для глаукомы дефекты поля зрения.
ВНУТРИГЛАЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ	Может быть ≥ 50 мм рт.ст., обычно в одном глазу.	Может быть ≥ 50 мм рт.ст., обычно в одном глазу.
СУБЪЕКТИВНЫЕ СИМПТОМЫ	Нечеткость зрения, радужные круги вокруг источников света, головная боль, в редких случаях - тошнота.	В редких случаях вначале нечеткость зрения и радужные круги вокруг источников света; возможна головная боль. Затуманенное зрение характерно для поздних стадий.